# 【日本医科大学付属病院　がん化学療法レジメン】

≪無断転載禁止≫

レジメン番号： OVA-119

| 対象疾患 | レジメン名称 | コース期間 | 総コース数 | 適応 | 催吐リスク | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵巣がん（再発） | Bv + weekly PTX | 28日間 | 規定なし | ■ 進行/再発<br>□ 術後補助化学療法<br>□ 術前補助化学療法<br>□ 放射線併用化学療法<br>□ その他 | 軽度 | J Clin Oncol 32: 1302-8, 2014 |

| | 薬品名 | 投与量 | 投与経路 | 投与時間 | Day 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | デキサート<br>ファモチジン<br>ポララミン<br>生理食塩液 | 6.6mg<br>20mg<br>5mg<br>50mL | 点滴静注 | 30分 | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | |
| ② | パクリタキセル<br>生理食塩液 | 80mg/㎡<br>250mL | 点滴静注 | 60分 | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | |
| ③ | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | 5分 | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | |
| ④ | アバスチン＊<br>生理食塩液 | 10mg/kg<br>100mL | 点滴静注 | 初回 90分<br>2回目 60分<br>3回目～ 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | 5分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

＜注意事項/備考＞

- ✓ PTX：0.2または0.22μmのインラインフィルターを用いて投与、DEHPを含まない輸液セット使用
- ✓ PTX：ポリオキシエチレンヒマシ油によるアレルギー発現に注意
- ✓ 末梢神経障害（PTX）：四肢の知覚異常が主体、疼痛を伴うこともあり
- ✓ Bv：出血、創傷治癒遅延あり、原則として術後4週間は投与せず / 血圧上昇（高血圧）に注意（自宅での定期的な測定・記録を）
- ✓ Bv：初回90分、2回目60分、3回目以降30分かけて投与
- ✓